

Tabelle 1: Kreis Siegen Wittgenstein- Chronik des Aussterbens einer Wiesenvogelart - der Bekassine

Abkürzungen: Brutpaare (Bp), Brutreviere (Br) bzw. Revierpaare (Rp)

Jahr	Siegerland	Wittgenstein
60er Jahre	<p>K.-D. Zimmermann (1973): Aus der Vogelwelt des Kreises Siegen</p> <p><u>Brutplätze:</u></p> <p>„Derschener Geschwemme“ Hünsborner Moor Ginsberger Heide Lipper Höhe: jeweils mehrere Bruten Lipper Höhe (1967 und 1969-71) vermutlich Oberdresselnsdorf; Einzelbrut bei Wilgersdorf 1971</p>	<p>H. König (1967): Die Vogelwelt des Kreises Wittgenstein</p> <p>„Seltener Durchzügler, vielleicht auch seltener Sommervogel. ...in früherer Zeit viel häufiger gewesen als heute“ (nennt Gründe für Rückgang: Regulierung Flussläufe, Trockenlegung weiter Sumpfgebiete sowie Entwässerung feuchter Wiesen).</p> <p>Zahl der erlegten Bekassinen 1871 bis 1905 nie hoch gewesen (8-15 Ex.)!</p> <p>In den letzten Jahren nur noch an wenigen Stellen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nähe Steinbach bei Müsse • In den Ederwiesen bei Aue • Feuchte Wiesen des unteren Benfetales (1948) • Raum Wunderthausen, Frühjahr 1966
70er Jahre	<p>A.Franz & J.Sartor 1979: Die Vögel des Siegerlandes Regelmäßiger Brutvogel:Häufigkeit 1 (1-5 Bp)</p> <p><u>Brutplätze</u>, die nach 1970 mindestens 1x besetzt waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-2 Bp Lipper Höhe • mind. 2 Bp Wetterbach bei Holzhausen (seit mind. 1977) • 1-2 Bp Gilsbachtal (mind. seit 1974) • 1 Bp Wildebachtal bei Salchendorf (mind. seit 1976) • 1 Bp „Alte Braas“ bei Wilgersdorf (1971-74) • 1 Bp Lützel (mind. seit 1977) <p><u>Weitere Brutzeitbeobachtungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geiersgrund (1976) ○ Weißbachtal bei Wilgersdorf (1972) ○ Hellertal unterhalb Wahlbach (1975) ○ Hellertal zwischen Neunkirchen und Zeppenfeld (nach 1970) 	<p>A.Belz & H. König (1983): Die Vogelwelt Wittgensteins Regelmäßiger Brutvogel: Häufigkeit (2-) 3, 100 gemeldete Beobachtungen , wobei diese sich aber auf wenige Gebiete konzentrieren. „Über die Bestandsentwicklungen lassen sich keine Angaben machen, da aus früheren Jahren nur wenige Angaben vorliegen.“ Ende der 70er Jahre erste konzentrierte Suche. „Beobachtung ziehender Bekassinen ist in den letzten Jahren rückläufig ist.“</p> <p><u>Laut Karte mehriährige Brutplätze</u> (ergänzt durch Angaben von T. Müsse und M. Frede):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuchtgebiet Lützel 1 Rv • Benfetal bei Benfe und Ludwigseck 2 Rv • Breitenbachtal östlich Erndtebrück1 Rv • Edertal östlich Erndtebrück 1 Rv • Westerbach westlich Wingshausen 1Rv • Bei Rinthe 1-2 Rv • Feuchtweide nördlich Weidenhausen 2 Rv • Weidenhausen, Kläranlage 1 Rv • Drehbach bei Stünzel 1 Rv • Südöstl. Stünzel 1 Rv • Edertal nördl. Beddelhausen (Auf der Zäune)1 Rv • Wabachtal 1 Ex. • Birkelbachtal zwischen Birkefehl und Birkelbach 2 Rv • Kasimirstal 1 Rv • Grundbach bei Hemschlar 1 Rv • Laasphe: Oberndorf und NSG Langenbachtal 2Rv • Beddelhausen 1 Rv <p><u>Vermutete Brutplätze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bärenkaute (südlich Erndtebrück-Schameder) • Bei Erndtebrück-Balde • Lahntal Niederlaasphe • Feuchtweiden bei Erndtebrück-Röspe • Laasphe: NSG Rüppersbach-Überm Herrmannsteg

Quellen für folgende Daten: J. Sartor, M. Frede et.al.: Ornithologische Jahresberichte für Siegerland und Wittgenstein in: Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt im Kreis Siegen-Wittgenstein, Bände 3,4,7-9

1992		<p>M. Frede 1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1Bp NSG „Sauerwiese“ bekannt <p>Bereiche verwaist: Erndtebrück-Hohlaue, Feuchtgebiet Lützel, Naßwiese Hohlaue</p>
1993	<p>A. Franz & J. Sartor 1995:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Bp Hellertalaue Wiederstein • 5-6 BP Wetterbachtal, Holzhausen • 4 Bp Lipper Höhe <p>Einzelbeobachtung während des Winters</p>	
1994	Während kreisweiter Braunkehlchenkartierung	
	<p>A. Franz & J. Sartor 1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bp Wetterbachtal, Holzhausen • 2-3 Bp Lipper Höhe • 1 Bp Ginsberger Heide • 1x Rufe Hellertal Wahlbach/Wiederstein (25.05.) 	<p>M. Frede 1995(Bekassinenbeobachtungen, z.T. balzend):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Rv Aue • 1 Rv Röspe, • 1 Rv Beddelhausen, • 1 Rv Weidenhausen, • 1 Rv Benfetal, • 1 Rv wahrscheinlich Nähe Lahnhof
1995	Kreisweite Wiesenbrütererfassung	
	<p>A. Franz & J. Sartor 1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mind. 3 BP Wetterbachtal • 2 Bp Lipper Höhe • 1 Bp Gernsdorfer Weidekämpe • 1 Bp Ginsberger Heide • 1 Todfund Weißtal, Wilgersdorf (25.08.) 	<p>M. Frede 1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Rv Ludwigseck • 1 Rv Schürmannshof • 1 Rv Röspe • 1 Rv Rinthe • 1 Rv Weidenhausen <p>Einzelbeobachtungen während des Frühjahrs- und Herbstzuges</p>
1996	Kreisweite Wiesenbrütererfassung	
	<p>A. Franz & J. Sartor 1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Bp Wetterbachtal • 1 Bp Lipper Höhe • 1 Bp Ginsberger Heide • 1x Rufe Hellertal Wahlbach/Wiederstein (18.05.) 	<p>M. Frede 1997:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Rv (wahrscheinlich) Weidenhausen • 1 Rv (wahrscheinlich) Ludwigseck <p>Einzelbeobachtungen während des Frühjahrs- und Herbstzuges</p>
	<p>A. Franz & J. Sartor 2002: „Der Rückgang der Bruten ist unverkennbar.“</p>	<p>M. Frede 2002: „ Die Bestandszahlen haben katastrophal abgenommen, ...“</p>
1997	<p>A. Franz & J. Sartor 2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Bp Ginsberger Heide • 2 Br Lipper Höhe • 2 Br Wetterbachtal • Rufe Hellertalaue (Wiederstein) 17.06. <p>Einzelbeobachtungen während des Herbstzuges und während des Winters</p>	<p>M. Frede 2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ex LB „Bonnwiesen“ Oberndorf (11.03., 22.03.) • 2x Rufe Bärenkaute Rammelsberg (31.03.) • 1 Ex auffliegend Schürmannshof (Benfetal) (15.05.) <p>Weitere Einzelbeobachtungen während des Frühjahrszuges</p>
1998	<p>A. Franz & J. Sartor 2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Br Lipper Höhe <p>Einzelbeobachtungen während des Winters</p>	<p>M. Frede 2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ex mehrfach Birkefehler Grund

1999	A. Franz & J. Sartor 2002: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ex Lipper Höhe (03.04.) • 2 Ex NSG „Gernsdorfer Weidekämpe“ (21.04.) • 2 Ex. NSG „Hellertal“ Wiederstein (17.06.) • 1 Ex. Wetterbachtal (19.06.) 	M. Frede 2002: Einzelbeobachtung während des Winters
2000		M. Frede 2002: Einzelbeobachtungen während des Frühjahrszuges
2001		M. Frede 2005: Kein Vorkommen im Benfetal nach Kartierung Einzelbeobachtung während des Winters
2002	J. Sartor 2005: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ex Lipper Höhe (30.03.) • 1 Ex Trupbacher Heide (20.04.) • 1 Ex Wetterbachtal Holzhausen (13.06.) Einzelbeobachtungen während des Frühjahrs- und Herbstzuges	M. Frede 2005: <ul style="list-style-type: none"> • Balzrufe im Benfetal bei Schürmannshof (20.06.)
2003	Kreisweite Wiesenbrütererfassung	
	Bestandserfassung Vogelschutzgebiet „Burbach Neunkirchen“	
	J. Sartor 2005: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Br Lipper Höhe Weitere Einzelbeobachtungen	M. Frede 2005: „Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Bekassine mittlerweile als Brutvogel ausgestorben.“ Einzelbeobachtungen während des Frühjahrszuges
2004	J. Sartor 2005: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Br Lipper Höhe • 1 Ex Wilgersdorf (07.04.) Einzelbeobachtungen während des Herbstzuges bzw. während des Winters	M. Frede 2005: Einzelbeobachtungen während des Herbstzuges
2005	J. Sartor 2010: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Ex Wetterbachtal Holzhausen (19.03.) • 1 Balzflug (16.04.) und 1x Rufe (24.04.) Lipper Höhe • 1 Ex an Heller, Zeppenfeld (30.08.) Weitere Einzelbeobachtungen während des Herbstzuges	M. Frede u.a. 2010: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ex Rufe +Sichtbeobachtung NSG „Langenbach“ Oberndorf (01.05.) • 2 Ex abfliegend Obere Espen Rückershausen (02.05.) Einzelbeobachtungen während des Frühjahrs- und Herbstzuges
2006	J. Sartor 2010: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ex Lipper Höhe (22.05., 23.05.) Einzelbeobachtung während des Herbstzuges	M. Frede u.a. 2010: Einzelbeobachtungen während des Frühjahrszuges
2007	J. Sartor 2010: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ex Lipper Höhe (25.03.) • 1 Ex Wetterbachtal Holzhausen (27.06.) Einzelbeobachtungen während des Herbstzuges	M. Frede u.a. 2010: Einzelbeobachtungen während des Herbstzuges
2008	J. Sartor 2010: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Rv Buchhellerquellgebiet • 1 bzw. 5 Ex Wetterbachtal Holzhausen (23.03., 30.03.) Einzelbeobachtungen während des Winters	M. Frede u.a. 2010: Einzelbeobachtungen während des Winters